

Supervivencia global en pacientes con cáncer de endometrio en el departamento del Tolima, Colombia.

Global survival in patients with endometrial cancer in the department of Tolima, Colombia.

Mora López Luis Miguel
Estudiante de Medicina X semestre
Universidad del Tolima

INTRODUCCIÓN

El cáncer de endometrio corresponde al 4.8% de las neoplasias ginecológicas en países desarrollados. En Colombia representa el 1.6% de las muertes por cáncer. El principal factor de riesgo es la exposición a estrógenos. El manejo convencional consiste en cirugía estándar (histerectomía total, salpingo- ooforectomía bilateral y vaciamiento ganglionar pélvico y paraaórtico). Sin embargo, desde hace algunos años existe controversia acerca del valor terapéutico de este enfoque.

Objetivo

Evaluar la supervivencia global en pacientes diagnosticadas con cáncer de endometrio, su asociación con factores pronósticos y el enfoque terapéutico seleccionado.

Metodología

Estudio de cohorte retrospectivo longitudinal. Datos recolectados desde enero de 2008 hasta diciembre 2016 en 3 instituciones de salud de Ibagué. Para el estudio de supervivencia global, la relación con factores pronósticos y enfoque terapéutico, se realizaron análisis de regresión logística binaria, regresión de Cox y método de Kaplan-Meier, utilizando el software estadístico SPSS.

Resultados:

Un total de 99 historias clínicas fueron encontradas, 26 de las mismas no cumplieron criterios de selección. De las 73 pacientes seleccionadas, el periodo mínimo de seguimiento fue de 4 meses y el máximo de 96 meses. La media de edad al diagnóstico fue 59.85 años \pm 10.245. La tasa de supervivencia al año fue de 97.3% y de 93.2% a 3 años de seguimiento.

El enfoque terapéutico con cirugía estándar presentó una supervivencia de 96,6% frente al 76,9% de no cirugía estándar. Existe diferencia estadísticamente significativa entre los dos tipos de terapia. ($X^2(1) = 6.318$ y $p = 0.012$).

Tanto en estadios tempranos como en localmente avanzados, el enfoque de tratamiento con cirugía estándar mostró mejores resultados en supervivencia a lo largo del seguimiento.

Conclusiones

El estudio reveló en esta población colombiana, que el enfoque de manejo radical con cirugía estándar del cáncer de endometrio en estadios tempranos y localmente avanzados fue superior al enfoque sin cirugía estándar.